



E. V. 2 40.12

HARVARD UNIVERSITY



LIBRARY

OF THE

Museum of Comparative Zoölogy

---





15.514.

E. D.

Z 48.12

**Zeitschrift**

für

**ENTOMOLOGIE.**

Herausgegeben

vom

**Verein für schlesische Insektenkunde**

zu

**Breslau.**

**Neue Folge. Sechszwanzigstes Heft.**

**BRESLAU. 1901.**

**In Commission**

bei

**Maruschke & Berendt.**

1777  
1778  
1779

**Zeitschrift**  
für  
**ENTOMOLOGIE.**

---

Herausgegeben

vom

**Verein für schlesische Insektenkunde**

zu

**Breslau.**

---

**Neue Folge. Sechszwanzigstes Heft.**

---

**BRESLAU. 1901.**

**In Commission**

bei

**Maruschke & Berendt.**





# Vereinsnachrichten.





# Vereinsnachrichten.

---

## Jahresbericht für 1900.

Der Verein hielt im verflossenen Jahre 44 Versammlungen ab, darunter die ordentliche Hauptversammlung am 19. Januar.

54 Vorträge und Demonstrationen entomologischen Inhalts belebten diese Abende.

Die Zahl der Mitglieder betrug am Beginn des Jahres 4 Ehrenmitglieder, 11 korrespondirende und 70 ordentliche Mitglieder.

Durch den Tod verlor der Verein seine langjährigen Mitglieder Professor Dr. Beinling und Eisenbahnsekretär Kuntze in Breslau und gegen Ende des Jahres sein Ehrenmitglied Herrn Dr. Staudinger in Blasewitz bei Dresden. \*) Der Verein wird denselben stets ein treues Gedenken bewahren.

Dagegen traten ein die Herren: Magistratssupernumerar Polentz und Privatlehrer Grützner aus Breslau.

Der Verein zählte daher am Jahresschlusse 3 Ehren-, 11 korrespondirende und 70 ordentliche Mitglieder.

Die Zahl der korrespondirenden Vereine u. s. w. betrug wie im Vorjahre 98.

Als Geschenke erhielt der Verein für seine Bücherei:

- 1) Becker: Die Leptiden-Formen im Gebiete der europäischen-asiatischen und Mittelmeerfauna vom Herrn Verfasser.

---

\*) Vergleiche bez. der Erstgenannten die Nachrufe in Heft XXV.. Ueber Dr. Staudinger sind in der langen seit dessen Tode verflossenen Zeit so viel Nachrufe von berufenen Federn erschienen, dass unsererseits von dem Abdrucke eines solchen Abstand genommen wurde.

- 2) Rostock: Neuroptera germanica,  
Brauer & Loew: Neuroptera austriaca,  
v. Heinemann: Tabellen zur Bestimmung der  
Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz,  
Neustädt & v. Kornatzki: Abbildungen und Be-  
schreibungen der Schmetterlinge Schlesiens Bd. I  
(kolorirt),  
sämtlich von Herrn Polizei-Sekretär Junge.
- 3) Fischer von Roeslerstamm: Abbildungen zur Berich-  
tigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde,  
besonders der Microlepidopterologie, als Supplement  
zu Treitschke's und Hübner's europ. Schmetter-  
lingen mit Text von Herrn Dr. M. F. Wocke.

Der Verein spricht den gütigen Gebern an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus.

Auf Vereinskosten wurden gehalten:

- 1) Stettiner entomologische Zeitung,
- 2) Entomologische Nachrichten.
- 3) Wiener entomologische Zeitung,

ferner wurde angeschafft:

- 1) Frank & Krüger: Schildlausbuch.
- 2) Favre & Wullschlegel: Faune des Macro-Lepidop-  
tères du Valais.
- 3) Stierlin: Coleoptera Helvetiae I.

Am 27. November beging Herr Dr. med. M. F. Wocke die Feier seines 80. Geburtstages. Eine Deputation des Vereins überbrachte dessen Glückwünsche zu dem Feste und überreichte dem Jubilar einen von den Vereinsmitgliedern gestifteten, mit einer Widmung versehenen silbernen Ehrenbecher.

---

Die geehrten Mitglieder werden ganz ergebenst ersucht, etwaige Wohnungs- und Aufenthaltsveränderungen baldigst dem Schriftführer anzuzeigen.

---

Die früheren Jahrgänge dieser Zeitschrift sind für Vereinsmitglieder durch den Schriftführer (Paulstrasse 34 II), für Nicht-

mitglieder durch die Buchhandlung von Maruschke & Berendt, Ring No. 8, zu folgenden Preisen zu beziehen:

Alte Folge Jahrgang 1—15 herabgesetzt Mk. 15 (für Mitglieder 9 Mk.),

„ 1—6 für Mitglieder Mk. 4,

„ 1—3 (1 Band) Mk. 1,50,

„ 4—15 (je 1 Band) Mk. 1,50.

Band VII ist nie erschienen.

Neue Folge Band 1 . . . . . Mk. 1,50

„ 2 . . . . . „ 6,00

„ 3—6 (je 1 Band) . „ 3,00

„ 7 . . . . . „ 5,00

„ 8—11 (je 1 Band) „ 3,00

„ 12 . . . . . „ 2,00

„ 13—16 (je 1 Band) „ 1,50

„ 17—25 (je 1 Band) „ 1,00

Entomologische Miscellen 1874 . . . „ 1,00

Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des

Vereins . . . . . Mk. 5.

Neue Folge Heft 1—6 für Mitglieder zusammen „ 9.

„ 1—13 „ „ „ 15.

Letzner Verzeichniss der Käfer Schlesiens II. Aufl. „ 8.

Für Mitglieder „ 4.

für  
Mitglieder  
die  
Hälfte.

Fauna transsylvanica von Dr. G. Seidlitz in Königsberg, Heft 1—6, sämtliche schlesische Käferarten enthaltend, kann von den Vereinsmitgliedern beim Schriftführer zum ermässigten Preise von 8 Mk. (für Auswärtige 8,50 Mk. baar oder in deutschen Briefmarken) bezogen werden.

## Auszüge aus den Protokollen.

5. Januar. Herr Cutler spricht über Insekten aus Canada.
18. Januar. Herr Schnabel legt einen Theil seiner vorjährigen Ausbeute an Faltern aus den Alpen vor; bemerkenswerth sind darunter besonders *Parnassius Apollo* mit gelben statt rothen Augen; *Melitaea Dictynna* mit ganz schwarzen Unterflügeln; *Melitaea Adippe* ab. *Cleodoxa* mit breitem schwarzen Saumrande auf allen Flügeln; *Mel. Euphrosyne*, theilweise albinistisch; *Pararg. Megaera* mit 2 Augen in der Spitze der V.-F.

Herr Dittrich berichtet über Leop. Krüger: Insektenwanderungen zwischen Deutschland und den vereinigten Staaten von Nordamerika. Stettin 1899.

26. Januar. Herr Dietl legt vor seine vorjährige Käferausbeute aus Baiern.
2. Februar. Herr Dittrich zeigt einige von G. Friese erhaltene Nester von Bienen und Wespen. Besonders interessant ist das mit einer Schutzhülle von Kiefernadeln versehene Nest von *Osmia bicolor* und ein Stein mit einem vollständig erhaltenen Nest von *Megachile muraria*; letzteres Stück ist dem Vortragenden von Herrn Friese nur für einen Vortrag gütigst geliehen worden.
9. Februar. Herr Schnabel spricht über den 2. Theil seiner vorjährigen Falterausbeute, welcher die Eulen und Spanner umfasst. Bemerkenswerth sind besonders *Agrotis strigula* var. *marmorea*, *Agr. candelarum* var. *signata*, *Agr. Helvetina*; *Dianth. proxima* und *magnolii*; *Caradrina gilva*; *Cidaria simulata* var. *gueneata*, *Cid. acmulata* und *Tephronis Cremiaria*.

Herr Pastor Benner theilt in einem Briefe an Herrn Lehmann mit, dass er *Cyclopides Morpheus* neu für Schle-

sien entdeckt habe und zwar bei Wehrse Kr. Guhrau auf feuchtem Waldboden ziemlich zahlreich fliegend.

Herr Wutzdorf legt vor *Abraxas silvata* var. *suffusa* und var. *obscura* aus England und *Zonosoma lennigiaria* ab. *aestiva* vom Rhein.

16. Februar. Herr Dittrich legt vor eine kleine Sammlung europäischer Hummeln.
23. Februar. Herr Jander theilt mit, dass ein ♀ von *Syntomis Phegea*, welches in Münster a. St. gefangen wurde, Eier abgelegt habe. Die Raupen nahmen kein frisches, sondern nur trockenes Futter und zwar Maisblätter an, sie sind jetzt erwachsen und dürften sich bald verpuppen.
2. März. Herr Dittrich bespricht die 8. Lieferung des *Herbarium cecidiologicum*.
9. März. Herr Wutzdorf legt vor *Callimorpha Hera* ab. *lutescens* aus der Normandie und *Saturnia minor* = *spini* ♂ *pavonia* ♀. Herr Wolf bespricht seine vorjährige Falterausbeute aus Steiermark, gewonnen in den Thälern bis zur Höhe von 1900 m.
16. März. Herr Kletke spricht über die Athmung der Wasserkäfer. Die grösseren Dytisciden athmen wie alle Käfer. Von den 9 auf jeder Seite liegenden Luftlöchern (Stigmen) liegt das 1te in der Verbindungshaut zwischen Vorder- und Mittelbrust, das 2te zwischen der Hinterbrust und dem 1ten Rückenhalbringe des H.-L., die andern 7 an den Seiten des 2—8ten Halbringes des H.-L.-Rückens. Die durch filzige Klappen verschliessbaren Löcher sind spaltförmig, die beiden letzten Paare von erheblicher Grösse.

Die Käfer kommen von Zeit zu Zeit an die Luft, strecken die H.-L.-Spitze etwas heraus und lassen, indem sie den H.-L. etwas zurückbiegen, eine Portion Luft unter die Flügeldecken treten, sperren den aufgenommen Vorrath durch Andrücken des Hinterleibes ab und verproviantiren sich so für einige Zeit.

Anders die kleinen Dytisciden (*Agabus*, *Ilybius*). Sie nehmen die Luft in Gestalt eines am H.-L.-Ende haftenden Bläschens mit und kommen meist in grader Haltung mit senkrecht nach unten gehaltenem Kopfe zum Luftholen herauf.

Die Gyriniden brauchen zur Empfangnahme der Luft nicht die Flügeldecken zu heben, da diese an der Spitze abgestumpft sind. Sie nehmen bei längerem Verweilen unter Wasser ebenfalls die Luft in Form eines an dem II.-L.-Ende haftenden Bläschens mit. Die Luftblase zieht sich zusammen und dehnt sich aus beim Aus- und Einathmen. Wahrscheinlich wird die Luft (wie bei Parnus) von einem von dem Haarüberzug der letzten II.-L.-Ringe sich absondernden Firniss umschlossen und von der Aufsaugung durch das Wasser geschützt.

Ganz anders ist die Athmung bei den Hydrophiliden. Der grösste derselben *Hydr. piceus* besitzt eine grosse an der Grenze zwischen Brust und H.-L. liegende Tracheenblase. Die merkwürdige Athmung hat zuerst Prof. Vitsch (Halle † 1837) erforscht, doch blieb diese Entdeckung unbeachtet. So oft der Käfer an der Oberfläche des Wassers erscheint, wobei er sich unter den Pflanzen am Rande aufhält, streckt er den Kopf hervor, streckt die Fühler aus und dreht dieselben so, dass die Basis der Keule die Spitze der Brust berührt. Dabei tritt die atmosphärische Luft über die seidenartigen Härchen der Fühlerkeule hinweg in Verbindung mit der Luftschicht, die sich an den Haaren der Bauchseite befindet. Frische Luft tritt zu und die verbrauchte Luft geht auf demselben Wege ab. Von der Bauchseite aus tritt dann die frische Luft unter den Flügeldecken zu den dort befindlichen Luftlöchern.

30. März. Herr Graf Matuschka legt vor einen Zweig einer amerikanischen Eiche, welche durch die noch darin befindliche Raupe von *Zeuzera pyrina* ausgehöhlt worden. Herr Gartendirektor Richter, der ihm den Zweig geschickt, theilt mit, dass die Eichen im Südpark massenhaft von diesen Raupen befallen worden sind, wodurch viel Schaden entstanden ist. Die Frage, wie dem Uebel vorzubeugen sei, beantwortet Herr Goetschmann dahin, dass die befallenen Bäume tüchtig zu beschneiden und die Raupen zu tödten seien. Die Schmetterlinge finden sich zahlreich an ein-



heimischen Eschen, sitzen aber ziemlich hoch und sind deshalb nicht leicht in grösseren Mengen abzulesen.

Herr Wolf legt eine Auswahl der von ihm voriges Jahr in den Alpen gefangenen Käfer vor.

27. April. Herr Graf Matuschka legt vor 2 *Trichius fasciatus*, die Herr Wiskott aus Norwegen mitgebracht hat, dieselben sind ungewöhnlich klein.

Herr Goetschmann spricht über *Calligenia venata* und *Cistidia stratonice* vom Amur.

4. Mai. Herr Dr. Wocke spricht über eine kürzlich von Lüders—Hamburg herausgegebene Monographie der Gatt. *Phyllocnistis*. Bekannt waren bisher *Ph. saligna*, überall gemein an Bruch- und Saalweiden, und *Ph. suffusella*, deren Raupen in den Blättern aller Pappelarten miniren sollten. Zeller, der Begründer der Gattung, hat aber einen Irrthum begangen, indem er auch die in den Blättern von *Populus tremula* lebende *Phyllocn.* als eine Varietät von *suffusella* ansah. Lüders fand die Ansicht Sorhagen's, dass die an *Pop. tremula* lebende Art wegen der grossen Unterschiede, welche die Minen gegenüber denen an *Pop. nigra* aufweisen, eine selbständige Art sein müsse, bestätigt, nachdem ihm die Zucht der Falter geglückt war, und nannte die neue Art *Ph. sorhageniella*. Dieselbe unterscheidet sich u. a. von den beiden anderen Arten durch das rein weisse Basalfeld der V.-F., welches bei *saligna* 2 braune Längsstriche zeigt, bei *suffusella* 2 verdunkelte Stellen im Mittelraume. Nun hatte der Vortragende vor Jahren bei Breslau an *Pop. alba* ebenfalls Phyll.-Minen gefunden, die sich von denen der *suffusella* unterschieden und aus denselben 4 Falter erzogen, die sich nach Lüders' Ansicht lediglich durch einen mehr bläulichen Ton in der Farbe der Flügelfransen von *sorhageniella* unterscheiden. Die Minen dagegen zeigen einen von denen der *sorhageniella* ganz abweichenden Verlauf, so dass die Möglichkeit gegeben ist, dass hier noch eine 4te Phyll.-Art vorliegt.

Derselbe meldet noch als eine für Schlesien neue Art an: *Antiopila Petryi* Martini. Herr Dr. Wocke hat in

Scheitnig an *Cornus sanguinea* eine grosse Anzahl von Minen dieser Art gefunden; ihm selbst ist zwar die Zucht nicht geglückt, dagegen hat Herr Martini in Sömmerda die Falter aus ihm übersandten Breslauer Minen erzogen.

Herr Schnabel legt vor einen Kasten seiner Sammlung, enthaltend die Gatt. *Satyrus*.

11. Mai. Herr Dittrich theilt neuere Entdeckungen über die Fortpflanzung des Hummers nach Prometheus mit.

Herr Schnabel spricht über *Ophyderes Tyrannus*, *Uropia Meticolodina* und eine neue noch nicht beschriebene Art, sämmtlich aus Sibirien.

18. Mai. Herr Gaertner legt vor einige Falter vom Amur und aus Spanien.

8. Juni. Herr Dittrich berichtet über seine Pfingstausbeute aus Charlottenbrunn. Dieselbe war leidlich bezüglich der Blattwespen, verschwindend bezüglich der Bienen, von denen nur wenige beobachtet wurden. Ebenso haben schlechte Ausbeute erzielt Herr Nagel in Lissa, Herr Dietl auf der hohen Mense. Diese Armuth der Insektenwelt scheint nicht auf Schlesien beschränkt zu sein, da nach einem Berichte aus Davos dieselben Falter, welche 1899 am Comer See reichen Fang geboten hatten, dies Jahr dort so gut wie gar nicht zu finden waren.

22. Juni. Herr Nagel macht aufmerksam auf eine Zeitungsnotiz, wonach bei Mühlhausen i. Els. ein Eisenbahnzug infolge unzähliger Myriopoden zum Stillstande gekommen sei.

Herr Schnabel legt vor einige im Tausch erhaltene Falter: *Euprepia vivularis*, *Arctia Issyka*, *Arctia Leopardina*, *Agrotis Junonia* und *Lagoptera elegans*, alle vom Amur, Herr Wutzdorf einige Falter aus Jerusalem.

29. Juni. Herr Dittrich legt vor 2 der Schulsammlung des Zwinger-Realgymnasiums angehörende Kasten, die Schutzfärbung von Insekten darstellend.

31. August. Herr Schnabel theilt mit, dass er *Eugonia autumnaria* aus dem Ei gezogen habe; die Falter sind z. T. schon ausgekommen. Auffällig ist, dass die leeren Puppenhüllen ganz verschieden gefärbt sind, was bei einigen wohl

auf die beim Auskriechen zurückgebliebene Feuchtigkeit zurückzuführen, bei andern aber nicht dadurch zu erklären ist.

Herr Dietl legt vor Fangflaschen aus Wien, die recht praktisch zu sein scheinen, namentlich bei Verwendung von Aether.

14. September. Herr Schnabel berichtet über Rössler: Bestimmungstabellen der Raupen der Tagschmetterlinge etc. Die Raupen sind nicht nach dem System, sondern nach der Aehnlichkeit geordnet, namentlich erscheinen Noctuen und Bombyciden durcheinander gewürfelt; infolgedessen ist das Bestimmen der Raupen nach den Tabellen recht umständlich, die Beschreibungen der Thiere sind nicht eingehend bezw. nicht genau genug, zum Beweise hierfür verliert Herr Schnabel die Beschreibung der Raupe von *capsincola*, um dieselbe mit den mitgebrachten normalen Raupen der Art vergleichen zu lassen.

21. September. Herr Dr. Wocke knüpft an seinen Vortrag vom 4. Mai d. J. an und theilt mit, dass in der Umgegend von Breslau und bei Potsdam *Phyllocnistis sorhageniella* nur an der Silberpappel und nie an *Pop. tremula*, umgekehrt dagegen in Thüringen und bei Regensburg an der letzteren gefunden werden; dagegen finden sich die Minen in der Umgegend von Troppau massenhaft an *Pop. tremula*, aber auch an *Pop. alba*.

Herr Goetschmann legt einen Kasten seiner Sammlung vor, enthaltend den 2ten Theil der Gatt. Botys.

28. September. Herr Dittrich macht Mittheilungen über Käfer als Fleischkonservenfabrikanten nach Prometheus.
5. Oktober. Herr Wutzdorf legt vor eine Sammlung von Orthopteren, besonders Mantiden aus Syrien.
12. Oktober. Herr Dittrich bespricht die von ihm bei Berchtesgaden gesammelten Gallen, besonders interessant sind darunter durch Milben an *Corylus Avellana* verursachte Knospenwucherungen, bei welchen (vielleicht infolge des günstigen Wetters) Entfaltung von kleinen, vielfach roth gefärbten Blättchen stattgefunden hat.
26. Oktober. Herr Dittrich berichtet nach Prometheus über neuere Beobachtungen bezüglich des Texas-Fiebers.

Herr Jander legt vor den kleinsten und grössten *Lucanus cervus* seiner Sammlung.

Herr Dietl theilt mit, dass früher *Otiorrhynchus multipunctatus* als schlesisch aufgeführt worden sei, wobei aber jedenfalls eine Verwechslung mit *O. irritans* Zerst. vorgelegen habe. Die beiden Arten sind einander auch so ähnlich, dass eine Verwechslung leicht möglich ist.

2. November. Herr Junge legt vor einen Kasten mit grossen exotischen Libellen.
9. November. Herr Dittrich berichtet nach Prometheus über die Gehörorgane der Crustaceen.
16. November. Herr Schnabel legt Amurschmetterlinge, Herr Stertz Falter vom Amur und aus Spanien vor.
30. November. Herr Dittrich legt 2 der Schulsammlung des dem Realgymnasium am Zwinger angehörige Kasten vor, Schutzfärbungen der Insekten darstellend, Herr Graf Matuschka einige Rüsselkäfer vom Vesuv, einen Ohrwurm, der in vulkanischem Sande in der Nähe des Kraterrandes sehr häufig war, und eine ebenda gefundene, aber seltenere Hemiptere.

Herr Wutzdorf spricht über *Melanargia Tithea* und die bei Haifa (Syrien) gefangenen Varietäten derselben.

14. Dezember. Herr Wutzdorf spricht über *Deiopeia pulchella*, gefangen bei Haifa (Syrien). Die Art ist dort zahlreich vertreten, die Exemplare sind aber schwer rein zu erhalten, da einmal viel Wind herrscht, andererseits die Falter vielfach aus kugelförmigen Disteln herausgeholt werden müssen. Die Raupen leben nur auf Beifuss, der auf Flugsand vorkommt. Binnen wenigen Wochen folgt eine 2te Generation der ersten.

Herr Goetschmann legt vor einen Kasten seiner Sammlung, enthaltend *Botys* und *Eurycreon*; von letzterer Gatt. ist in Schlesien am häufigsten *Eur. palealis*, deren Raupen in den zusammengezogenen Dolden von *Daucus carota* leben.

Herr Stertz zeigt als von Herrn Paulus (Jerusalem) erhalten vor *Chondrostega Fasciana* und eine zweifelhafte neue Art der Gattung.



## Kassenbericht für 1900.

Kassenbestand Ende 1899 . . . . . 970 Mk. 09 Pf.

### Einnahmen:

1) an Mitgliederbeiträgen	238 Mk. 95 Pf.	
2) an Zinsen . . . . .	29 „ 06 „	
3) an Erlös für verkaufte		
Zeitschriften etc. . .	31 „ 55 „	= 299 „ 56 „
		<u>Summa 1269 Mk. 65 Pf.</u>

### Ausgaben:

1) an Druckkosten für die		
Vereinsschrift N. F.		
H. 24 u. s. w. . . . .	117 Mk. 49 Pf.	
2) Feuer - Versicherungs-		
Prämie . . . . .	3 „ 90 „	
3) für angeschaffte Bü-		
cher, an Buchbinder-		
Kosten, Porto, Druck-		
sachen, Papier u. s. w.	140 „ 47 „	= 261 „ 86 „

Bleibt als Kassenbestand Ende 1900 . . 1007 Mk. 79 Pf.

Im Rückstande blieben mit Jahresbeiträgen:

2 Mitglieder mit zusammen 10 Mk.

Anm. Nach Beschluss der Haupt-Versammlung vom 15. Januar 1886 werden alle Restanten durch den Kassenwart gemahnt.



## Verzeichniss der Mitglieder.

### Ehrenmitglieder.

Dr. Koch, praktischer Arzt in Nürnberg.  
 Edmund Reitter in Paskau, Mähren.  
 Dr. Kraatz in Berlin W., Linkstrasse 28.

### Korrespondirende Mitglieder.

Dr. Penzig, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Genua.  
 E. Weise, Lehrer, Berlin N. 58, Kastanien-Allee 100.  
 Dr. O. Schmiedeknecht, Blankenburg in Thüringen.  
 Dr. G. Seidlitz in München, Schwindstr. 27.  
 Gerhardt, Oberlehrer in Liegnitz.  
 H. Friese in Jena i. Th., Wagnergasse 28.  
 G. Sparre-Schneider, Kustos am zoologischen Museum in Tromsö.  
 Dr. D. H. R. von Schlechtendal in Halle a. S.  
 Dr. Karl Daniel in München, Zieblandstr. 37/o.  
 Dr. Josef Daniel, Chemiker am k. b. Hauptlaboratorium bei Ingolstadt.  
 Ew. Rübsaamen in Berlin N., Triftstrasse 2 I.  
 Konow, Pastor in Teschendorf bei Stargard in Mecklenburg.  
 Dr. Rebel, Kustos am K. K. Hofmuseum in Wien, Burgring 7.  
 Dr. Em. Lockay, Bezirksarzt in Prag 1061 II.  
 P. Gabriel Strobl, Direktor des Privat-Gymnasiums und des naturhistorischen Museums in Admont (Steiermark).

### Ordentliche Mitglieder.

1. Ansorge, Landesbau-Inspektor in Breslau, Schiesswerderplatz 11. Col.
2. Bäuerlin, Kaufmann in Breslau, Neue Taschenstr. 11. Lep.

3. Becker, Stadtbaurath a. D. in Liegnitz. Dipt.
4. Benner, Pastor an der Königl. Strafanstalt in Rawitsch (Posen). Lep.
5. Benner, stud. rer. nat., Breslau, Oelsnerstr. 8<sup>II</sup>. Col. Lep.
6. Cutler, Landwirth P. O. Box 232 C/O. Mrs. Bruce Calgary Alberta Canada. Lep.
7. Dietl, Kaufmann in Breslau, Neue Gasse 13<sup>a</sup>. Col.
8. Dittrich, Realgymnasialprofessor in Breslau, Paulstr. 34<sup>II</sup>. Hym. Vereinsschriftführer.
9. Fauna, Entomologischer Verein in Leipzig.
10. Fein, Geh. Baurath in Köln. Col.
11. Findeklee, Zollpraktikant in Berlin, Tegel Hauptstr. 27<sup>II</sup>.
12. Förster, Pastor primarius in Landeshut i. Schl. Lep.
13. Gabriel, Generalmajor in Neisse. Col.
14. Gaertner, A., Partikulier in Breslau, Wörtherstr. 25<sup>hpt</sup>. Lep.
15. Görlich, cand. rer. nat., Berlin C., Sophienstr. 23<sup>II</sup>. Col.
16. Götschmann, Dr. phil., Gymnasial-Oberlehrer in Breslau, Gr. Feldstr. 10<sup>eIII</sup>. Lep. Stellvertretender Schriftführer.
17. Grützner, Privatlehrer, Breslau, Kreuzburgerstr. 10<sup>I</sup>. Lep.
18. Hanke, Kgl. Eisenbahn-Sekretär a. D., Rentmeister in Kentschkau Post Schmolz. Col.
19. Hartmann, Dr. phil., in Breslau, Sternstr. 58<sup>II</sup>. Hem.
20. Hieronymus, G. H., Professor, Dr. phil., Kust. am Kgl botanischen Museum. Schöneberg bei Berlin, Hauptstr. 14<sup>I</sup>.
21. Hirt, Wilhelm, Rittergutsbesitzer in Cammerau bei Schweidnitz. Lep.
22. Hoy, Friseur in Breslau, Kaiser-Wilhelmstr. 25<sup>a</sup>. Lep.
23. Jander, Kgl. Eisenbahn-Sekretär a. D. in Breslau, Lohestrasse 12<sup>II</sup>. Lep. Kassenwart.
24. Junge, Polizei-Sekretär in Breslau, Gräbschenerstr. 36<sup>II</sup>. Lep. Neur.
25. Katter, Dr. phil., Gymnasialprofessor in Putbus. Col.
26. Kleinert, Eisenbahnbetriebs-Sekretär in Breslau, Berlinerstrasse 39<sup>II</sup>. Lep.
27. Kletke, Paul, Stadtältester in Breslau, Bahnhofstr. 5. Col. Stellvertretender Vorsitzender.

28. Kletke, Erich, Verwalter der Hospitalapotheke in Breslau, Nikolaistr. 46. Lep.
29. Kluge, Rob., Kgl. Eisenbahnzeichner in Kattowitz O./S. Lep.
30. Kolbe, Rektor in Liegnitz. Col.
31. Kossmann, Landgerichtsath in Liegnitz. Col.
32. Kothe, Kgl. Seminarlehrer in Proskau.
33. Krykon, Carl, in Stettin, Viktoriaplatz 5<sup>III</sup>. Lep.
34. Küenthal, Dr. phil., ord. Professor an der Universität und Direktor des zoologischen Instituts in Breslau, Bismarckstrasse 19<sup>I</sup>.
35. Langner, Rechnungsrath in Breslau, Paulstr. 29<sup>II</sup>. Bot.
36. Lehmann, Landes-Sekretär a. D. in Breslau, Lothringerstrasse 16. Lep. Col. Bücherwart.
37. Martini, Wilhelm, Kaufmann in Sömmerda. Lep.
38. Marx, Dr. med., Oberstabsarzt a. D. in Neisse. Col.
39. Matuschka, Graf, Kgl. Forstmeister a. D. in Breslau, an der Kreuzkirche 4. Col.
40. Mochmann, Lehrer in Brieg. Lep.
41. Nagel, Volksschullehrer in Breslau, Heilige Geiststr. 12. Lep.
42. Peschke, Sparkassenbeamter in Oppeln, Fesselstr. 9. Lep.
43. Pietsch, Steuerinspektor in Ohlau. Col.
44. Polentz, Magistratssupernumerar in Breslau, Kreuzstr. 44. Col.
45. Rademacher, Rektor in Breslau, Sternstr. 52<sup>pt</sup>. Lep.
46. Rehfeldt, Major in Posen, Oberwallstr. 1. Lep.
47. v. Roeder, Oekonom in Hoym in Anhalt. Dipt.
48. Sajo, Karl, Professor in Buda-Pest VII, Wesselenyigasse 46. in Ungarn. Col. Hym. Hem.
49. Schippang, Kaufmann in Breslau, Wallstrasse 1<sup>a</sup>. Lep.
50. Schiwon, Eisenbahn-Direktor in Glogau. Lep.
51. Schlegel, Stadt-Leihamtsdirektor a. D. in Breslau, Maxstrasse 42. Col.
52. Schmeidler, Rechtsanwalt und Notar in Liegnitz. Lep.
53. Schnabel, Rechnungsrath in Breslau, Kaiser-Wilhelmstrasse 35. Lep.



54. Schnabl, Dr. med. in Warschau. Dipt.
55. Scholz, Bernhard, Lehrer an der Hedwigsschule in Liegnitz. Col.
56. Schumann, Provinzial-Steuersekretär in Breslau. Andersonstr. 27. Lep.
57. Sokolowski, Lokomotivführer a. D. in Liegnitz, Raupachstrasse 20 I. Col.
58. Standfuss, Professor Dr. phil., Direktor des entomologischen Museums am eidgenössischen Polytechnikum in Hottingen, Zürich. Lep.
59. Stanke, Kunstgärtner in Gräbchen bei Breslau. Lep.
60. Stertz, Kaufmann in Breslau, Wallstr. 8. Lep.
61. Thilo, technischer Provinzial-Sekretär in Breslau, Holteistrasse 95. Lep.
62. Thorwarth, Kgl. Zeughaus-Büchsenmacher in Glatz. Lep.
63. Tischler, Lehrer in Rodeland, Kr. Ohlau, Post Laskowitz, Bez. Breslau. Col.
64. Wiskott, Max, Kaufmann und Fabrikbesitzer in Breslau, Kaiser-Wilhelmstr. 69 II. Lep.
65. Wocke, M. F., Dr. med. in Breslau, Feldstrasse 6. Lep. Vereins-Vorsitzender.
66. Wocke, Georg, Kaufmann in Aschersleben i. Harz. Lep.
67. Wocke, Felix, Dr. jur., Rechtsanwalt und Notar in Frankenstein. Lep.
68. Wolf, Staatsanwaltschafts-Assistent in Breslau, Marianenstrasse 1 b II. Lep.
69. Wolff, Eisenbahnbetriebs-Sekretär in Breslau, Hermannstrasse 13. Lep.
70. Wutzdorf, Partikulier in Breslau, Friedrich-Wilhelmstr. 71. Lep.
71. Freie Standesherrliche Bibliothek in Warmbrunn.



## Inhalt.

---

Vereinsnachrichten . . . . .	pag. I.
------------------------------	---------

---

<b>Gerhardt, J.</b>	Ueber <i>Xantholinus linearis</i> Kr. und <i>longiventris</i> Heer . . . . .	„ 1.
„	Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen . .	„ 6.
„	Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1900 . . . . .	„ 15.
„	Eine neue Käferart . . . . .	„ 18.
<b>Schnabel.</b>	Ueber die Zucht von <i>Arctia flavia</i> . . . .	„ 22.
<b>Jander.</b>	<i>Pleretes matronula</i> L. . . . .	„ 24.
„	<i>Thais polyxena</i> Schiff. . . . .	„ 26.
„	<i>Lucanus cervus</i> L. . . . .	„ 28.
<b>Grützner.</b>	Ueber die Eierablage von <i>Endromis versicolora</i>	„ 29.



# Abhandlungen.





# Ueber *Xantholinus linearis* Kr. und *longiventris* Heer.

Von J. Gerhardt—Liegnitz.

---

Die meisten Autoren — ich nenne Kraatz, Heer, Fuss, Bethe, Seidlitz, Muls. et Rey — sehen in *Xantholinus linearis* und *longiventris* zwei specifisch verschiedene Arten. Ganglbauer dagegen zieht sie neuerdings in Eine Art zusammen, und auch die Grundskulptur von Kopf und Halsschild Uebergänge erkennen lasse, die eine Scheidung unmöglich machen.«

Ich nahm mir vor, ähnlich wie im Vorjahre bei *Leptacinus linearis* und *batychnus*, durch lange fortgesetzte, recht genaue Vergleichung den entgegenstehenden Ansichten näher zu treten und kam dadurch zu dem Endresultat, dass beide Formen nicht Einer Art angehören. Ich führte die Untersuchung an  $\frac{2}{3}$  getrockneten Exemplaren, zusammen an etwa 130 Stücken aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands. Die Spaltung des vorletzten Dorsalsegments beim ♂ konnte leider nur an äusserst wenig Exemplaren bis an die Basis des Segments verfolgt werden, da die beiden letzten Segmente fast immer mehr oder weniger eingezogen erscheinen. Zur Beurtheilung der Grundskulptur wurde das Mikroskop verwendet, für die übrigen Fälle reichte die Loupe.

Dass beide Arten einander sehr ähnlich sind, bestreitet Niemand, aber bei näherer Betrachtung ergeben sich Verschiedenheiten, welche von den oben genannten Autoren zur Auseinanderhaltung benutzt wurden. Dahin gehören besonders Grösse und Farbe und die Punkte in der Dorsalreihe des Halsschildes.

In der That sind an den von mir beobachteten Objekten ♂ und ♀ von *linearis* durchschnittlich kürzer und schmaler als von *longiventris*, Halsschild und Flügeldecken zeigen öfterer eine Neigung zur Verbräunung und der Punkte in der Dorsalreihe des Halsschildes sind mehr als bei *longiventris*.

Während ich die Färbungsverschiedenheiten für belanglos halte und auszuscheiden genöthigt bin, muss ich Grösse und Punktzahl in den Halsschildreihen für recht beachtenswerth halten. Bezüglich der letzteren benutzte ich eine gleich grosse Anzahl (12) von nicht besonders ausgesuchten Stücken jeder Art. Bei *linearis* zeigten sich  $10 \times 12$ ;  $1 \times 11$  und  $1 \times 14$  Punkte, bei *longiventris*  $1 \times 12$ ,  $3 \times 11$  und  $8 \times 10$  Punkte, bei ersterer Art also durchschnittlich 12, bei letzterer 10. Hierzu bemerke ich noch: es kommt nicht selten vor, dass bei *Xantholinus*-, *Philonthus*- u. a. Arten zuweilen der eine oder andere Punkt in beiden Reihen unausgebildet bleibt, zuweilen enthält eine Reihe die Normalzahl der Punkte, die andere nicht; aber auch der Fall ist bei *Xantholinus*, namentlich bei *longiventris* nicht selten, dass von den daneben liegenden schwächeren Halsschildpunkten der eine oder andere zwischen die stärkeren Punkte der Reihe tritt und dadurch eine höhere als die normale Durchschnittszahl vortäuscht.

In der mir zugänglichen Litteratur ist nur von obigen, mehr in die Augen fallenden Unterschieden die Rede, nirgends findet sich ein Hinweis auf die letzten Hinterleibssegmente, die so oft bei Staphylinen von sexueller Bedeutung sind, und ebensowenig Näheres über die Grundskulptur, von der nur die des Kopfes und Halsschildes in Betracht gezogen wird. Meine nach dieser Richtung geführten Untersuchungen haben nun folgende Resultate geliefert.

## A. Die letzten Segmente.

### a. *Xantholinus linearis*.

♂: Ventralsegment 6 ist etwas flach gedrückt und hat in der Mitte des Hinterrandes eine sehr schwache Ausbuchtung. — Dorsalsegment 7: seine Innenträger tragen 8 bis 10 Haare in fast regelmässiger Reihe. Diese Haare sind eben

so lang und stehen eben so undicht als die darüber befindlichen. — Das Analsegment: seine Oberseite erscheint, wenn vollständig sichtbar, nach der Basis hin sehr scharf zugespitzt, nach dem Hinterrande dreieckig-, seitlich etwas bogig-erweitert, den Raum zwischen den beiden nach vorn verjüngten Seitentheilen des 7. Segments genau ausfüllend, gewöhnlich mit schwacher Mittelwölbung, der emporgehobene Seitenrand nicht die Mittelwölbung überragend; der Hinterrand ist abgestutzt, mit nach hinten abstehenden, seitlich etwas längeren gelben, dicht stehenden Haaren. Die Unterseite des Analsegments ist conform der Oberseite gestaltet, aber eben, am Hinterrande stumpf abgerundet und ein wenig weiter vortretend.

♀: Dorsalsegment 7 ist ungetheilt, konisch, am Hinterrande bogig ausgeschnitten, das am Hinterrande gerundete, meist sichtbare kleine Aftersegment umfassend und unterseits soweit zurückgezogen, dass vom Analsegment ein bedeutend grösserer Theil der Unterseite sichtbar wird. Diese verengt sich zum Hinterrande und ist auf ihrer Mitte der Länge nach etwas flach gedrückt, mit äusserst feiner Grundskulptur und äusserst feinen Haarpünktchen, oder, wie dies bei getrockneten Stücken öfters der Fall ist, muldenförmig.

#### **b. *Xantholinus longiventris*.**

♂: Ventralsegment 6 ist gewölbt, in der Mitte des Hinterrandes mit einer schwachen, oft kaum wahrnehmbaren Ausbuchtung, oder nicht gebuchtet.

Dorsalsegment 7: dessen Spitze und die Innenränder seines Spaltes doppelt so dicht behaart als bei linearis.

Das Analsegment: Form wie bei linearis, doch sind die Seitenränder seiner Oberseite stärker aufgebogen, ihre mittlere Partie weniger erhaben, an getrockneten Stücken sogar muldenförmig und der Hinterrand fast grade, mit schwacher Neigung zur Ausbuchtung. Die Unterseite wie bei linearis, aber ihr Hinterrand abgestutzt, wie bei der Oberseite, und etwas weniger vorragend, so dass am Hinterrande der Oberseite eine scheinbare Randung entsteht. Die Täuschung wird man am besten inne, wenn eine stoffliche Ausscheidung in die Afteröffnung tritt; dann verschwindet die Randung sofort.

♀: Segment 7 gleicht in seiner Gesamtbildung der von linearis; bei Segment 8 sind die Grundskulptur und die zerstreuten Haarpünktchen der Unterseite noch feiner als bei linearis.

## B. Die Skulptur.

Wie schon oben bemerkt, ist bisher nur die Grundskulptur von Kopf und Halsschild in Betracht gekommen. Es ist richtig, dass es Stücke giebt, bei denen Kopf und Halsschild oben wie unten schraffirt erscheinen und solche, bei denen diese Skulptur nur unterhalb zu sehen ist, während sie oberhalb entweder ganz oder theilweise fehlt. Ich habe gefunden, dass erstere — solche also mit lückenloser Schraffirung — stets zu linearis, alle andern dagegen stets zu longiventris zählen. Es lässt sich das aus der Beschaffenheit der Schraffirungslinien schliessen. Diese erscheinen bei linearis nämlich tiefer und stärker — gute Vergrösserung und helles Licht vorausgesetzt — und ihre Interstitien etwas schmaler als an den gleichen Orten bei longiventris. Dieser Grundzug in der Schraffirung erstreckt sich nicht blos auf Kopf und Halsschild, sondern auch auf den Hinterleib, ist aber nicht in allen Theilen von derselben Beschaffenheit, da einzelne Organe oder Theile von Organen Abweichungen zeigen. So ist z. B. beim ♂ von linearis das Kinn ohne Chagrin, dagegen bei longiventris seitlich zart genetzt; so ist beim ♀ von linearis die Oberseite des Hinterleibes an der Basis sehr dicht, nach hinten allmählich weniger dicht schraffirt, beim ♀ von longiventris hingegen nur so dicht als bei linearis hinten. — Die einzelnen Segmente beider Arten sind nicht ganz gleichmässig, sondern gegen den Hinterrand etwas dichter schraffirt.

Auch hinsichtlich der Punktirung sind Artverschiedenheiten wahrnehmbar. Kopf- und Halsschildpunkte sind bei linearis etwas feiner und — auch abgesehen von denen der Dorsalreihe — zahlreicher. Auch die Flügeldecken sind, namentlich nach dem Hinterrande zu, dichter punktirt und, was an longiventris bisher von mir nicht beobachtet werden konnte, nicht selten zwischen den grösseren Punkten noch mit zahlreichen flachen Pünktchen und ebensolchen Ringeln versehen, wodurch solche



Stücke einen matteren Glanz erhalten. Die Decken von longiventris zeigten an meinen Objecten nie diesen matten Glanz, sondern waren meist zwischen den grösseren Punkten ohne Zwischenpunktirung und zeigten selten schwache Runzeln. Alle Hinterleibssegmente haben bei beiden Arten und in beiden Geschlechtern von hinten eingestochene feine Haarpunkte. Die dadurch auf ihrer Vorderseite gebildeten Höckerchen sind bei linearis deutlicher und auf der Dorsalseite des Hinterleibes schon bei vertikaler Ansicht mit Loupe erkennbar, während sie gut sonst nur von der Seite her gesehen werden können.

Zum Schluss möchte ich noch eines Umstandes Erwähnung thun, der ebenfalls für die Artverschiedenheit spricht: ich fing wiederholt beide Arten auch unvermischt, linearis in Jäte und longiventris erst vor Kurzem in 30 Exemplaren an unserer Kirchhofsmauer ohne ein Stück des linearis.



# Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

---

Beiträge lieferten die Herren: Generalmajor Gabriel—Neisse (Gb.), Oberlehrer Gerhardt—Liegnitz (G.), Rektor Kolbe—Liegnitz (Klb.), Landgerichtsrath Kossmann—Liegnitz (Ks.), Steuerinspektor Pietsch—Ohlau (P.), Lehrer Robert Scholz—Liegnitz (Sch.), Lokomotivführer a. D. Sokolowsky—Liegnitz (S.). Von Auswärtigen Dr. Lokay—Prag (Dr. L.).

Ofters genannte Sammelorte sind: L. = Liegnitz, Kaltwasser Kr. Lüben, Buchwald i. Rsgb., Quanzendorf Kr. Nimptsch, Waldenburg a. Altv., Schweinsdorf b. Neustadt, Hochwald b. Brieg, Ellguth b. Steinau i. Oberschles., Ullersdorf Kr. Landeshut i. Rabengebirge.

---

*Bembidium obtusum* Serv. Quanzendorf (Gb.).

*Pterostichus interstinctus* St. Schweinsdorf (Gb.).

Zuweilen, doch s. s., bildet sich bei *Lagarus vernalis* ein mehr oder weniger deutlicher Scutellarstreifen aus. Ein solches Stück lag vor aus der Gegend von Ohlau (P.).

*Ochthebius Czwalinae* ist im Letzner'schen Verzeichniss in *narentinus* Rtrr. umzuschreiben. Das einzige von mir bei L. entdeckte schlesische Stück lag Herrn L. Ganglbauer vor, der es mit böhmischen und ungarischen Stücken von *narentinus* identisch fand.

*Creniphilus bipustulatus* Marsh. Quanzendorf (Gb.).

*Cercyon obsoletus* Gyll. Waldenburg (Gb.).

*Cryptopleurum crenatum* Pz. An einem Komposthaufen in Buchwald z. hfg. (G.) 6.

*Megasternum boletophagum* Marsh. Ellgut (Gb.).

*Leptusa analis* Gyll. Rabengebirge (Ks.), *L. fumida* Er. ibid. (Ks.), *L. ruficollis* Er. n. s. unter Buchenmoos, ibid. (Ks.).

*Ischnoglossa corticina* Er. Liegnitz, unter Rinde eines alten Ulmenstumpfes (G. 5), Waldenburg (Gb.).

*Microglossa pulla* Gyll. Buchwald (G.), *nidicola* Fairm. 1 Stck. bei rothen Ameisen L. (Sch.).

*Aleochara lygaea* Kr. An Krähenas. Buchwald (G. 6).

*Ilyobates nigricollis* Payk. Schweinsdorf (Gb.).

*Gnypeta velata* Er. Neisse (Gb.).

*Homalota complana* Manh. Quanzendorf (Gb.), *laticeps* Th. Neisse (Gb.), *tibialis* Heer. Ullersdorf (Ks.), *luridipennis* Mnh. Buchwald (G. 6), *oblonga* Er. Ullersdorf (Ks.), *granigera* Ksw. Waldenburg (Gb.), *montivagans* Epp. 1 Stck. in meiner Sammlung aus dem Riesengeb. (G.), 1 Stck. in einem faulen Pilz bei Waldenburg (Gb.), *nitidicollis* Fairm. 1 Stck. von Gb. gefunden, *gagatina* Baudi Ullersdorf (Ks.), *livida* Rey. Buchwald (G.), *parvula* Mnh. an Vogelaas, Buchwald (G.), Ellgut und Wölfelsgrund (Gb.), *atomaria* Kr. wurde bei Quanzendorf unter alten Maisstoppeln gef. (Gb.), *angusticollis* Th. und *ravilla* Th. non Kr. an faulen Pilzen bei Quanzendorf (Gb.), *celata* Er. ibid., *amica* Steph. ibid. und Ullersdorf (Ks.), *mortuorum* Th. Quanzendorf (Gb.), *subtilis* Scriba Altvater (Gb.), *parva* Sahlb. Quanzendorf unter Maisstoppeln (Gb.).

*Oxypoda longipes* Rey. An ausgelegten Taubenknochen Neisse (Gb.), *O. humidula* Kr. Quanzendorf (Gb.), *atricapilla* Märkl. Waldenburger Geb. (G.), Panten b. L. (Ks.), *sericea* Heer. Quanzendorf (Gb.), *formosa* Kr. Waldenburg, an Pilzen (Gb.), *testacea* Er. Lähn a. Bober, Waldenburger Geb. und Spindelmühl (G.), Waldenburg unter Ahornrindenmoos (Gb.).

*Oxypoda rufescens* Kr. ist 1889 in Zugang gekommen, daher als Zugang von 1900 zu streichen. An den mir vorliegenden

Stücken ist die Punktirung des Kopfes stark und ziemlich dicht, nicht spärlich (s. Ganglb. Bd. II).

*Ocyusa incrassata* Rey. Ullersdorf (Ks.) 9.

*Gyrophæna affinis* Sahlb. *ibid.* (Ks.), *boleti* L. *ibid.* (Ks.).

*Hypocyptus seminulus* Er. Schweinsdorf (Gb.), Planken der Lübener Bahn b. L. (G.).

*Tachinus scapularis* Steph. Quanzendorf (Gb.).

*Conurus immaculatus* Steph. Buchwald (G.), Ullersdorf (Ks.), *lividus* Er. Neisse (Gb.). Ich halte diese Art nicht für Abart von *pedicularius* Grav., sondern mit Seidlitz für sp. pr., da die Decken stets länger sind als bei *pedicularius*.

*Conurus pedicularius* Gr. Schweinsdorf (Gb.).

*Bolitobius exoletus* Er. Ullersdorf (Ks.) 9.

*Megacronus rufus* Er. Schweinsdorf (Gb.).

*Quedius vexans* Epp. Neisse (Gb.), *cinctus* Payk. Quanzendorf (Gb.), *limbatus* Heer. Hochwald (Gb.), *scintillans* Gr. und *lucidulus* Er. Ullersdorf (Ks.).

*Philonthus addendus* Rossi an faulenden Blätterpilzen bei Neisse (Gb.), *sordidus* Gr. Quanzendorf (Gb.), *thermarum* Aub. an warmem Pferdedünger-Kompost L. n. s. (G. Ks.), *longicornis* Steph. unter Laub, Neisse (Gb.), *fumarius* Gr. Neisse (Gb.).

*Othius myrmecophilus* Ksw. Ullersdorf (Ks.).

*Baptolinus affinis* Payk. Riesengebirge (Gb.).

*Leptacinus parumpunctatus* Gyll. n. s. an Pferdedünger-Kompost. Buchwald, L. (G.), *linearis* Gr. unter *batychnus* und z. T. ebenso gefärbt, mit Vor. bei L. 8. 9. (G.).

*Xantholinus distans* Rey. Quanzendorf und Hochwald (Gb.).

*Lathrobium ripicola* Czwalińska Neisse (Gb.), *pallidum* Nordm. Schweinsdorf (Gb.).

*Scopaeus cognatus* Rey. Waldenburg aus faulen Pilzen (Gb.), Quanzendorf an Birkensaft (Gb.).

*Stilicus orbiculatus* Er. Neisse (Gb.), Quanzendorf aus Maisstoppeln (Gb.).

*Sunius immaculatus* Steph. Neisse (Gb.).

*Paederus brevipennis* Lac. Quanzendorf (Gb.).

*Stenus crassus* Steph. Neisse (Gb.), *brunnipes* Steph.

Buchwald (G. 6.), *fornicatus* Steph. Neisse (Gb.), Kolbei Germ. Hochwald (Gb.), *coarctatus* Epp. Altvatergipfel (Gb.).

*Oxytelus Fairmairei* Pand. Waldenburg, unter Ahornmoos (Gb.), *clypeonitens* Pand. Ellgut (Gb.).

*Trogophloeus fuliginosus* Gr. an einem Komposthaufen in Buchwald n. s. (G. 6.), *pusillus* Gr. *ibid.*, z. hfg. (G.).

*Syntomium aeneum* Müll. Waldenburg (Gb.).

Ein Stück des häufigen *Omalium rivulare* Payk. mit ganz dunklen Fühlern ist wohl s. s. Gb. fand ein solches.

*Omalium exiguum* Gyll. Schweinsdorf (Gb.), *pusillum* Gr. Ullersdorf (Ksm.) und zwar die var. *punctipenne* Th., welche, wie es scheint, die Berge bevorzugt; *monilicorne* Gyl. Mittelberg bei Wölfelsgrund unter Ahornrinde (Gb.), *scabriusculum* Kr. Ullersdorf, unter einer Wildraufe (Ks. 9), *excavatum* Steph. und *concinnum* Marsh. Ullersdorf (Ksw. 9.).

*Anthobium aucupariae* Ksw. Quanzendorf (Gb.), Marshami Fauv. Waldenburg (Gb.) 5.

*Protinus atomarius* Er. Ullersdorf (Ks.).

*Megarthrus nitidulus* Kr. Schweinsdorf (Gb.), *affinis* Mill. Quanzendorf (Gb.).

*Phloeobium clypeatum* Müll. Quanzendorf (Gb.).

*Bythinus validus* Aub. Hochwald (Gb.).

*Tychus niger* Payk. Wiesenberg i. Rsgb. (Gb.).

*Euplectus sanguineus* Denny in Kompost und unter faulem Heu, Liegnitz (G.), *piceus* Mot. unter morschen feuchten Holzspänen bei Waldenburg (Gb.).

*Trichonyx sulcicollis* Reichb. Weissenroder Damm b. L. unter Rinde eines morschen Ulmenstumpfes bei Ameisen (G. 5.).

*Cephennium laticolle* Aub. ist im Verzeichniss zu streichen und dafür zu setzen *C. Reitteri* Bris., *laticolle* Rtrr. Neisse und Quanzendorf (Gb.).

*Euconnus denticornis* Müll. Hochwald (Gb.), *nanus* Schaum. Buchwald (G. 6.).

Für *Choleva angustata* F. unseres Verzeichnisses ist Ch.

*Sturmi* Bris., *angustata* Er. Rttr. zu setzen. An einer Mauer, Neisse (Oberstabsarzt Dr. Marx).

*Ptomaphagus fuscus* Pz. Schweinsdorf, Quanzendorf (Gb.). — Zu *nigricans* gehört als synonym (nach Ganglbauer) auch der 1889 im Verz. als sp. pr. publizierte *flavicornis* Th. Er lässt sich sehr wohl als unausgefärbter *nigricans* auffassen. Dagegen bildet der im Verz. mit *nigricans* vereinigte *fuliginosus* Er. (nach Ganglb.) gute Art und ist als var. zu streichen. — *P. grandicollis* Er. Quanzendorf (Gb.), *anisotomoides* Spence. Quanzendorf, unter Moosstoppeln, Schweinsdorf (Gb.).

Im Verzeichniss ist umzuändern (nach Ganglb.) *Hydnobius punctatissimus* Steph. in *punctatissimus* Er., *punctatus* Gyll., *multipunctatus* Gyll. und zu *H. punctatus* St. ist als synonym hinzuzufügen *punctatissimus* Steph.

*Cyrtusa minuta* Ahrens ist bei L. s. s., ziemlich häufig dagegen *C. pauxilla* Schmidt.

*Agathidium mandibulare* St. Glatzer Geb. (Gb.), *varians* Beck. Neisse (Gb.).

*Cybocephalus politus* Gyll. Riesengeb. (Gb.).

*Clambus minutus* St. Riesengeb., Neisse, Quanzendorf (Gb.), Ullersdorf (Ks.). *C. punctulum* Gyl. sieht Ganglb. nur als Zwergform von *minutum* an, wäre dann zu streichen.

*Millidium minutissimum* Motsch. Buchwald, an einem Düngerhaufen (G. 6.) z. s.

*Ptilium Spencei* Allib. und *excavatum* Gillm., beide n. s. mit Vor. (G. 6.), *affine* Er. Riesgb. (Gb.).

*Nephanes Titan* Newm. N. s. mit Vor. und im Bruch bei faulendem Heu, auch bei Kompost bei L. (G. 6—9).

*Trichopteryx Chevrolati* Allib. Buchwald bei Kompost (G. 6) Liegnitz im Bruch, an beiden Orten s. s. (G. 9), *brevipennis* Er. Buchwald (G.), Neisse (Gb.), *lata* Matth. Ullersdorf und *fascicularis* Mtth. *ibid.* (Ks.), *atomaria* var. *Oertzeni* Flach. Wölfelsgrund (Gb.), *thoracia* Walzl. L. im Bruch unter faulendem Heu (9) und Buchwald an Kompost (6 G.).

Eine *Orthoperus*-Art bleibt mir fraglich, die ich in keiner

der Beschreibungen von Kraatz, Reitter und Ganglbauer erwähnt finde, eine grössere 0,7 bis 0,8 mm lange braune Art, mit seitlich, hinten und an der Basis quer genetzten, in der Mitte gleichmässig, aber sehr flach rundlich-maschigen Decken und undicht stehenden, einfachen, graden Strichpunkten, die scheinbaren Striche von 3—4facher Länge der Doppelstriche von O. Kluki und nur unterm Mikroskop deutlich als Haare erkennbar. Ganglbauer hält sie für atomus; mir freundlichst von ihm später gesendete Stücke bestätigten es. Vorläufig möge darauf aufmerksam gemacht sein, dass Schlesien fünf gut unterschiedene *Orthoperus*-Arten zählt.

Im Verzeichniss ist *O. punctum* Marsh. als synonym zu *atomus* Gyl. zu setzen.

*Phalacrus substriatus* Gyll. Altvatergeb. (Gb.).

*Myrmecoxenus vaporariorum* Guér. Töpferberg bei L. in Kompost (9. G.).

*Talmatophilus sparganii* Ahrens. Neisse (Dr. Marx).

Für *Cryptophagus baldensis* ist im Verzeichniss zu setzen *C. silesiacus* Ganglb. — *C. Schmidtii* Sturm. Neisse (Gb.), *subfumatus* Kr. Wiesenbaude (Gb.).

*Coenoscelis ferruginea* Sahlb. Riesengeb. (Gb.).

*Atomaria diluta* Er. Quanzendorf, unter Maisstengeln und Schweinsdorf (Gb.). — *A. alpina* Heer ist im Verzeichniss zu *elongatula* zu ziehen, *atrata* Reitt. als var. zu *prolixa* Er., ebenso *pulchra* Er.; *A. pulchella* Heer soll heissen *pulchella* Rtt., diese dagegen tritt als synonym zu *munda* Er. und *pulchella* Heer zu *nigripennis* Payk. (Nach Ganglb.) *A. munda* bei L. nur in 1 Stck. (G.), *bicolor* Er. L. (G.), *turgida* Er. Schweinsdorf (Gb.).

*Lathridius lardarius* Deg. Quanzendorf und Neisse (Gb.), *angusticollis* Hummel. Riesengeb. (Klette's Sammlung nach Gb.), Neisse (Gb.), *Bergrothi* Reitt. Kottwitz bei Breslau (Gb.).

*Enicmus hirtus* Gyl. Riesengeb. (Gb.). — In unserm Verzeichniss steht *E. anthracinus* als synonym bei *minutus*, dahin zieht ihn auch Ganglb., Seidlitz dagegen zu *brevicollis*,

von dessen ♂ Ganglb. sagt, dass es 2 kräftige Höckerchen in der Mitte des Hinterrandes vom letzten Segment habe. Darnach fehlt uns der *brevicollis*, also der Seidlitz'sche *anthracinus*. Und doch möchte ich die im Gebirge so häufige Form des *minutus*, die bisher als *anthracinus* galt, genauerer Beachtung werth halten, da Hinterbrust und erster Bauchring nie dicht punktirt sind, wie bei unserm *minutus* der Ebene. Aber ich habe trotz eines sehr reichlichen Materials auch noch keine Höckerchen sehen können, so dass es wohl *brevicollis* nicht sein kann.

*Corticaria linearis* Payk. Riesengeb. (Gb.). — Nach Ganglb. ist *C. denticulata* Gyl. mit *impressa* Ol. zu vereinigen. — *C. foveola* Beck. Wölfelsgrund (Gb.).

Nach gefälliger brieflicher Mittheilung des Herrn Dr. Rodt—Prag ist von ihm *Epuraea Fussi* nicht bei Spindelmühl (Zeitschr. f. E. in Breslau 1900, p. 5) gefunden worden, sondern irrthümlich aufgeführt.

*Meligethes lumbaris* St. Quanzendorf (Gb.), *bidens* Bris. Buchwald (G. 6.), *bidentatus* Bris. Quanzendorf (Gb.).

*Rhizophagus perforatus* Er. Buchwald (G. 6), *bipustulatus* F. nur mit heller Spitze der Decken: Schweinsdorf (Gb.). So selten.

*Laemophloeus alternans* Er. Buchwald (G.). Zweiter schles. Fundort.

*Monotoma subquadrioveolata* Waterh. ist als eigene Art zu cassiren und tritt als Var. zu *picipes* Hbst. (nach (Ganglb.)). Kommt bei L. unter *picipes* zuweilen vor (G.).

*Hadratoma marginata* Payk. Hochwald, von einem alten Knüppelzaune geklopft (Gb.).

*Anthrenus verbasci* L. Neisse (Gb.).

*Acritus nigricornis* Hoffm. und seine Var. *affinis* m., also die Form mit einfachen und Strichpunkten auf den Decken kommen bei L. mit einander und in ziemlich gleicher Zahl vor, es könnte daraus mit Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, dass es die beiden Geschlechter der Art sind, zumal andere Unterschiede nicht bemerkt werden. Ein 2tes Stück der Var. *sulcipennis* Fuss in Kompost bei L. (G. 9.).



- Cryptohypnus rivularius* Gyll. Wiesenberg im Rieseng.  
in trockenem Moose zwischen Steinen mehrfach (Gb. 7).
- Corymbites pectinicornis* L. Hochwald (Gb.).
- Dasytes fuscus* Ill. Hochwald (Gb.).
- Bruchus* (*Ptinus*) *subpilosus* var. *nigrescens* Gerh.  
Waldenburg, unter Ahornrinde (Gb.), *bicinctus* St. Waldenburg (Gb.), *subpilosus* St. Ullersdorf (Ks. 9).
- Nach dem Kataloge von 1891 sind *B. bidens* Ol. und *raptor* St. 2 gute Arten.
- Anobium emarginatum* Dft. Quanzendorf (Gb.).
- Hedobia imperialis* L. Hochwald (Gb.).
- Cis festivus* Pz. Hochwald (Gb.), *lineatocribratus* Mell.
- Ennearthron cornutum* Gyl. Hochwald (Gb.).
- Scaphidema metallicum* F. Hochwald (Gb.).
- Omius forticornis* Boh. Schweinsdorf (Gb.).
- Ein Erkennungszeichen für *Hypera palumbaria* im Vergleich mit *comata* und *oxalydis* ist auch die Grundskulptur des Halsschildes: bei *palumbaria* besteht dieselbe aus dicht gestellten rundlichen, etwas gewölbten Felderchen, einem Lederwerk ähnlich, bei *comata* aus queren Runzeln und bei *oxalydis* aus glatten Flächen. *H. comata* Boh. Waldenburger Gebirge bei Lomnitz (Ks.).
- Liosoma cribrum* Gyll. Waldenburg, unter Ahornrinde (Gb.), Riesengeb. (Klette'sche Sammlung nach Gb.).
- Trachodes hispidus* L. Ohlau (S.) n. s. an abgefallenen Eichenästen, Schweinsdorf (Gb.).
- Dorytomus occalescens* Gyll. Buchwald (G.).
- Bagous tempestivus* Hbst. Quanzendorf (Gb.).
- Acalles lemur* Germ. Neisse und Quanzendorf (Gb.).
- Balaninus venosus* Grav. Schweinsdorf (Gb.).
- Anthonomus humeralis* Pz. Im v. J. hfg. auf Haseln, d. J. fast noch verbreiteter auf *Prunus padus*. Buchwald (um die Niederteiche) 6. (G.).
- Miarus graminis* Gyll. Das erste Stück für die L. Gegend an einem abgeschälten Weidenstamme (8) und Buchwald (G. 6).
- Orchestes subfasciatus* Gyll. Schweinsdorf und *erythropus* Germ. *ibid.* (Gb.).

- Ceuthorrhynchus viduatus* Gyll. Schweinsdorf (Gb.)  
    *litura* F. Neisse (Gb.), *rugulosus* Hbst. Quanzendorf  
    und Neisse (Gb.).
- Apion assimile* Kirb. Schweinsdorf (Gb.), *filirostre* Kirb.  
    *ibid.*
- Rhynchites interpunctatus* Steph. Schweinsdorf und  
    Brieg (Gb.), *pauillus* Germ. Neisse und Quanzendorf,  
    (Gb.).
- Xyleborus dryographus* Ratzeb. Panten (Ks.).
- Grammoptera ruficornis* F. Schweinsdorf (Gb.).
- Rhopalopus macropus* Germ. Quanzendorf (Gb.)
- Stenostola ferrea* Schrank. Schweinsdorf, von einer Linde.  
    Schweinsdorf (Gb.).
- Pachnephorus pilosus* Rossi. Neisse (Gb.).



# Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1900.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

---

*Cercyon plagiatus* var. *terminatus* Marsh. L. und Buchwald i. Riesengeb. an Mist (G.).

*Leptusa puellaris* Hampe. Dr. Lokay—Prag fand diese Art zahlreich durch Sieben aus Graswurzeln und *Vaccinium* auf dem Altvater. Durch Vergleich mit typischen Stücken der *L. puellaris* konnte die Identität mit ihr festgestellt werden. Dr. Lokay hat sie als *L. sudetica* in der Wiener entom. Zeitschr. beschrieben. — Nach ihm sammelte dieselbe Art auch Herr Generalmajor Gabriel—Neisse ebendasselbst ziemlich zahlreich, fand auch ein Stück davon auf dem Glatzer Schneeberge und eins auf dem Wiesenberge im Riesengebirge. Anfang August fand Herr Landgerichtsrath Kossmann—Liegnitz ein Stück bei Ullersdorf Kreis Landeshut, also im Rabengebirge. Es lässt sich daraus schliessen, dass das bisher übersehene Thier über fast die ganzen Sudeten verbreitet ist, aber nur im südöstlichen Zuge derselben zahlreicher auftritt und nicht bloß aufs Hochgebirge beschränkt ist, sondern auch bis ins Vorgebirge herabsteigt.

Da in der Beschreibung Dr. Lokays die Kennzeichen des ♂ nicht erwähnt sind, so füge ich hinzu:

♂: Ventralplatte des vorletzten Hinterleibssegments bis auf den Grund gespalten; Aftersegment auf der Ventralseite mit sehr deutlichem Kiel und seitlich mit gebogenem, schmalen Anhängsel.

- Dinarda pigmaea* Wassm. Herr Dr. Rodt—Prag hatte die Freundlichkeit, mir Wassmann'sche Stücke zur Verfügung zu stellen. Die Art steckte in meiner Sammlung als *dentata* Gr. und stammt aus dem Bober-Katzbachgebirge (Hohe Gulge).
- Homalota indubia* Sharp. Mehrfach im Wölfelsgrunde der Grafschaft Glatz unter einer Vogelleiche (Würger) in Moos (Gabr.).
- H. germana* Sharp., *arenicola* Thoms. Buchwald i. Rsg. bei Mist (Gerh.), Nimptsch und Riesengebirge (Gabr.).
- H. inconspicua* Er. Altvater (Gabr.).
- Quedius ochripennis* Mén. Im Angeschwemmten der Katzbach bei Liegnitz (Rektor Kolbe).
- Xantholinus longiventris* Heer trenne ich von *linearis* als sp. pr. (S. meine Abhandlung.) Die Art tritt also dem *Numerus schles.* Käfer zu.
- Stenus excubitor* Er. Ein Stück dieser Seltenheit, ein ♂, siebte Herr Rektor Kolbe im »Verlorenen Wasser« bei Panten Kr. Liegnitz aus Laub. 6.
- Thinodromus hirticollis* Muls. et Rey. Gelegentlich einer Katzbach-Ueberschwemmung bei Liegnitz einige Stücke. (Kolbe.)
- Omalium concinnum* var. *atrum* m. Decken schwarzbraun. Ein Stück dieser Form bei Buchwald i. Rsg. geköschert (Gerh.) 6.
- Ptomaphagus fuliginosus* Er. Nach Ganglb. sp. pr. Liegnitz (Gerh.), Glatzer Geb. (Gabr.).
- Phosphuga atra* var. *subparallela* Rtt. Bisher nur aus dem Kaukasus und Sibirien bekannt. Bei Neisse (Gabr.).
- Ptenidium intermedium* Wank. Jakobsdorfer See (Kolbe).
- Ptenidium turgidum* Thoms. Kaltwasser Kr. Lüben (Kolbe).
- Micrus filicornis* Fairm. Im Bruch des Schwarzwassers bei Liegnitz unter faulendem Heu. 9. 10. Selten (Gerh.).
- Baeocrara littoralis* Thoms. Einige Stücke im Rabengebirge bei Ullersdorf unter einer Wildraufe (Kossmann, 8). Es dürfte dies der zweite Fundort für Deutschland sein.
- Atomaria clavigera* Ganglb., *atra* Rtt., non Herbst. In der Ebene und im Vorgebirge. Brechelshof unter Moos 7. Lähn, Liegnitz (5. G.).

*Cantharis figurata* var. *luteata* Schilsky. Häufig Anfang Juni in Buchwald i. Rsgb. in der Nähe von Teichen von *Prunus padus* geklopft, auch einige Stücke, bei denen das sonst schwarze Schildchen mehr oder weniger, sogar ganz gelb erscheint. In diesem Falle ist die Art immer noch am besten an den schmal gelb gesäumten Abdominalsegmenten zu erkennen und von *C. bicolor* mit breit gesäumten Segmenten gut zu unterscheiden.

*Apion pisi* var. *Kossmanni* Gerh. So nenne ich ganz schwarze Stücke des sonst blauen *pisi*, von denen eins Herr Landgerichtsrath Kossmann von hier griff.

*Choragus Sheppardi* var. *nitidipennis* m. Von dieser Var. haben mir 3 Stücke vorgelegen, eins aus dem »Verlornen Wasser«, unter Laub gefunden (verunglückt), eins von früher her in meiner Sammlung und eins von Neisse (Gabr.). Keins dieser 3 konnte *piceus* sein, da die Halschildbildung ganz die von *Sheppardi* ist. Ausserdem stimmen die Stücke auch in der Grösse mit dieser Art überein. Aber die Decken haben den Glanz derer von *piceus* und die Interstitien ihrer Punktreihen zeigen eine sehr schwache, undeutliche Punktirung. Möglich, dass hier eine dritte Art vorliegt.

*Longitarsus nigerrimus* Gyll. Ein Stück bei Neisse (Gabr.).

---

### Nachtrag.

*Helophorus crenatus* Rey. Im Schwarzwasserbruch bei Liegnitz z. hfg., Brechelshof Kr. Jauer, Neuhaus im Waldenburger Berglande in einem reich mit *Glyceria fluitans* bewachsenen Tümpel häufig. Dagegen ist *strigifrons* Thoms. bei Liegnitz und an den beiden anderen Orten noch nicht aufgefunden. Ob die von Letzner als *strigifrons* aufgeführte Art richtig bestimmt ist, kann nur seine Sammlung entscheiden. (determ. Ganglbauer.)

Der Numerus aller sicheren schlesischen Käferarten beträgt jetzt 4400.

---

# Eine neue Käferart.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

---

## **Salpingus Gabrieli n. sp.**

Elongatus, niger, nitidus, glaber. Antennis basi rufo-testaceis, apicem versus nigris, articulis 7—10 tam longis quam brevibus. Capite inter oculos non evidenter convexo, hic inter antennarum insertiones depresso et ibi fere quater latiore quam longiore. Labro paulo longiore quam latiore. Thorace ante tam lato quam caput, cordiforme. Capite thoraceque densissime punctatis, hoc post basim paulum depresso. Elytris fere parallelis, subdepressis, paucis transversalibus depressionibus post basim. Femoribus nigris, tibiis tarsisque majus minusve dilutis vel obscuris. Long. 3 mm.

In montibus Silesiae.

Die nach mehreren Exemplaren beschriebene *Salpingus*-Neuheit gehört der Beschaffenheit der Oberlippe nach der Untergattung *Rabocerus* Muls. an. Ihr nächster Anverwandter ist *Rabocerus foveolatus*. *R. Lederi* Rtrr. kommt wegen seiner stark gewölbten Decken nicht in Frage, und von den echten *Salpingus*-Arten hat nur der französische *Reyi* Muls. grössere Aehnlichkeit mit *Gabrieli*.

*Rabocerus Gabrieli* ist leicht erkennbar an der bei ausgefärbten Stücken stets schwarzen Farbe seiner Ober- und Unterseite, dem fast ungewölbten Scheitel, dem schwachen Quereindrucke des Halsschildes, den fast parallelen, etwas flach gedrückten, längeren Flügeldecken, den schwarzen Schenkeln und der dichten Punktirung auf Kopf und Halsschild.

Eine Vergleichung mit *Rabocerus foveolatus* führte zu folgenden Resultaten.

Die durch den Ausschnitt für die Fühler-Insertion gebildete seitliche Ecke des Vorderkopfes liegt bei Gabrieli deutlich näher den Augen als dem Vorderrande der Oberlippe, bei foveolatus ziemlich in der Mitte. — Die Oberlippe von Gabrieli ist etwas länger als breit, bei fov. etwas kürzer als an der Basis breit, beide in der Basalhälfte durch sehr dichten, äusserst feinen Chagrin matt. — Oberlippe und Kopfschild von Gabrieli sind verschiedenfarbig, letzteres braungelb, Oberlippe dunkler, bei fov. gleichfarbig braungelb. — Das Kopfschild von Gabrieli ist durch eine feine Kante vom Vorderkopfe getrennt, bei foveol. fehlt dieselbe. In beiden Arten ist das Kopfschild unpunktirt, aber bei foveolatus von vorn nach hinten reichlich nur halb so breit als bei Gabrieli. — Der Vorderkopf von Gabrieli, also der Theil zwischen den Kopfecken und dem Kopfschilde, ist quer fast viermal so breit als lang, dicht gerunzelt und schwach punktirt, bei foveol. nur doppelt so breit als lang und weitläufig gerunzelt und stärker punktirt. — Die Stirn ist bei Gabrieli flach eingedrückt und sehr dicht und ebenfalls stärker punktirt als der Vorderkopf, bei foveol. deutlich eingedrückt, ebenso stark, aber weniger dicht punktirt als der Vorige. — Der Scheitel von Gabrieli ist ganz schwach gewölbt, tief, sehr dicht punktirt, mit Spuren von Chagrin, die Punktkanten berühren sich; foveol. ist hier weniger dicht punktirt, doch eben so kräftig und die Punkte sind durch ebene, glatte Flächen getrennt, Chagrinspuren aber nicht vorhanden, der Scheitel dagegen deutlich gewölbt. — Die vorletzten vier Fühlerglieder sind bei Gabrieli, von der Breitseite gesehen, so lang als breit, bei foveol. etwas breiter als lang. Die Farbe der Fühler ist bei den sechs letzten Gliedern fast schwarz bei Gabr., bei foveol. höchstens schwarzbraun, gewöhnlich heller. — Bei Gabrieli ist das Halsschild vorn so breit als der Kopf, bei foveol. daselbst etwas breiter als der Kopf mit den Augen, dieser an der Basis halb so breit als die Decken, bei foveol. etwas breiter als die halbe Deckenbasis. Punktirung in beiden Arten wie bei ihrer Stirn und ihrem Scheitel. Die den abgerundeten Vorderwinkeln des Halsschildes parallel laufende punktirte Innenfurche reicht bei Gabrieli bis zur Seiten-

randmitte, bei foveol. bis  $\frac{2}{3}$  des Seitenrandes. Bei Gabrieli ist der Quereindruck vor der Halsschildbasis kaum und ein zweiter Quereindruck in der Mitte des Halsschildes nur schwach angedeutet, ein schwacher Wulst bezeichnet gewöhnlich die Grenze zwischen beiden Impressionen; bei foveol. ist der erste der beiden Eindrücke sehr deutlich, gewöhnlich durch eine Connectivfläche in zwei Grübchen getheilt, die mehr oder weniger nach aussen oder innen liegen und zuweilen sogar seitlich mit dem zweiten, schwächeren Quereindrucke in Verbindung stehen. — Die Decken sind bei Gabrieli nur sehr flach gewölbt und etwas länger als bei foveol.; sie besitzen hinter der Basis eine schwache, aber deutliche Querdepression und hinter dieser, vor der Mitte, noch eine zweite, zuweilen undeutliche, von der Seite gesehen am besten erkennbare. Die Punkte ihrer nur in der Mittelzone regelmässigen Streifen stehen wie bei Stirn, Scheitel und Halsschild ebenfalls so dicht an einander, dass sie sich mit ihren Kanten berühren. Die ungradzahligen Interstitien führen einige wenige zerstreute Punkte. Die Seiten verlaufen fast parallel. — Bei dem gewölbten foveolatus ist der Quereindruck hinter der Basis noch etwas deutlicher als bei Gabrieli, so dass sich zwischen Schulter und Schildchen eine flachgewölbte Anschwellung bildet, wie sie auch, doch schwächer, bei Gabrieli sichtbar ist; der zweite Eindruck vor der Mitte fehlt jedoch. Die Anordnung der Streifen gleicht der bei Gabrieli, aber die Punkte derselben berühren sich nicht. — Die Beine von Gabrieli sind etwas schlanker als die von foveol., die Schenkel stets schwarz, Schienen und Tarsen mehr oder weniger heller oder dunkler bräunlichgelb und an der Innenseite deutlich fein und ziemlich lang, etwas schräg abstehend behaart. An den Beinen von foveol. sind die Schenkel nie ganz schwarz, sondern meist heller gefärbt, noch heller Schienen und Tarsen und die Behaarung ist eine viel kürzere. — Der Penis ist bei Gabrieli gegen das Ende stärker gebogen und die scharfe Spitze deutlich länger als bei foveolatus.

Einige Stücke dieser Art klopfte Herr Generalmajor Gabriel—Neisse von trockenen Buchen- und Fichtenästen und einige fanden sich unter Ahornrinde bei Waldenburg am Alt-



vater, 1 Stück stammt von Mittelberge bei Wölfelsgrund und eins steckte in der Klette'schen Sammlung mit der Bezettelung »Riesengebirge.« Hiernach scheint das Thier im ganzen Zuge der Sudeten vorzukommen, steckt vielleicht auch noch in manchen Sammlungen bei *foveolatus*, mit dem allein es nur wechselt werden kann.

Dem oben genannten Entdecker, einem der ausdauerndsten und eifrigsten Mitarbeiter an der Erforschung der schlesischen Käferfauna zu Ehren ist die Art benannt.



# Biologisches.

---

## Ueber die Zucht von *Arctia flavia*.

Am 20. August 1899 erhielt ich 32 Eier von *Arctia flavia* aus Davos in der Schweiz, die schon wenige Stunden nach Empfang die Rupchen ergaben. Dieselben wurden in einem Glaskruschen mit Salat und Lowenzahn gefuttert und hauteten sich bereits am 26. das erste und am 31. August das zweite Mal. Im September verminderte sich indess aus mir unbekannten Ursachen die Fresslust und demzufolge die gleichmassige Entwicklung so erheblich, dass wahrend des ganzen Monats nur 2 Hautungen in sehr verschiedenen Intervallen erfolgten, wobei eine Anzahl im Wachsthum zuruckgebliebener Raupen zu Grunde gingen.

Im Oktober nahmen die Raupen, soviel ich wahrnahm, uberhaupt kein Futter mehr an, sondern begaben sich schon in die Winterruhe, die in einem aus Drahtgeflecht bestehenden Raupenkasten auf dem Hausboden erfolgte.

Im Marz des nachsten Jahres war dieselbe beendet und zahlte ich noch 17 lebende Raupen von sehr verschiedener Grosse, die aber keine rechte Fresslust mehr entwickelten, obwohl ihnen ganz frisches saftiges Futter vorgelegt wurde. Leider gingen in den ersten drei Wochen nach der Ueberwinterung wiederum 6 Raupen und zwar die kleinsten ein, so dass ich nur noch 11 lebende Raupen hatte. — Anfang April waren mir Rupchen von *Eugonia autumnaria* ausgekommen, die ich mit Lindenblattern futtern wollte, und da in dem ziemlich geraumigen Kasten, in welchem ich die *flavia* zog, noch Raum genug fur die *autumnaria*-Raupen war, so sperrte ich letztere dazu.

Zu meinem Erstaunen fand ich bei der nächsten Fütterung sämtliche flavia-Raupen auf den Lindenblättern mit grossem Appetit fressend, was mir um so wunderbarer war, als diese Raupen sonst nur an niedern Pflanzen leben und Linden auch in der Höhe der Alpen, wo flavia vorkommt, kaum mehr wachsen dürften.

Von nun an nährten sie sich ausschliesslich nur von Lindenblättern bis zu ihrer jetzt rasch vor sich gehenden Verpuppung. Bei dem ziemlich verschiedenen Entwicklungsgrade der einzelnen Raupen erfolgte das Einspinnen sehr verschieden, so dass der erste Falter schon ausgekommen war, während noch 5 Raupen fleissig frassen.

Die erste Raupe spann sich am 9. Mai ein und ergab bereits am 31. dss. Mts. den Schmetterling — 1 normalen ♂; also Puppenruhe ca. 3 Wochen. Das Schlüpfen der 11 erzielten Falter — 7 ♂♂ und 4 ♀♀ — erfolgte in der Zeit vom 31. Mai bis zum 8. August 1899. Eine zweimalige Ueberwinterung fand also nicht statt.

**Schnabel.**



## Pleretes matronula L.

---

Von 24 im März 1898 abgesetzten matronula-Eiern erhielt ich nach 14 Tagen 23 Rupchen, welche in den ersten Tagen als Nahrung Salatblttchen erhielten und annahmen. Nach der ersten Hutung wurden sie in einem engen hohen Glaskstchen auf Himbeerzweige mit noch recht kleinen Blttchen gesetzt, dort verblieben sie wieder circa 14 Tage. Die Himbeerbltter schienen ihnen nicht recht zu behagen und versuchte ich es mit *Prunus padus*, welches sie ausserordentlich gern frassen, ebenso gern wurde *Evonymus europaeus* angenommen. Diese beiden Arten habe ich nun den Thieren nur vorgesetzt. Da ich nicht alle Tage das Futter erneuern konnte, so musste ich es ins Wasser stellen, habe aber stets nach sptestens 3 Tagen frische Zweige eingestellt.

Die Raupen gediehen zusehends und hatten nach 6 Wochen schon die brunliche Frbung der Haare angenommen. Besprengt mit lauem Wasser wurden sie bei Erneuerung des Futters. Bei Eintreten der Hutung setzten sich smmtliche Thiere in einem Winkel zusammen und zogen mit Fden Bltter und kleine Zweige zusammen, um sich zu schtzen, ich hatte alsdann nicht nthig, frisches Futter einzustellen, da es oft 6—7 Tage dauerte, ehe die Thiere wieder an die Nahrung gingen.

Anfang Oktober waren 19 Raupen brig geblieben. 4 Stck waren eingegangen, meist beim Hutungsprozess, der Rest, also 19 Stck, waren vollstndig ausgewachsen und zur Ueberwinterung reif. Da ich sie jetzt noch nicht ins Winterlager bringen konnte, so wurde der Kasten mit ihnen in ein khles

Zimmer gestellt und dort bis Eintritt kalter Temperater belassen. Mitte November brachte ich die noch munteren Raupen, welche die letzte Zeit fast keine Nahrung angenommen, in einen geräumigen, mit Moos und Topfscherben zu  $\frac{1}{4}$  angefüllten Kasten — die Wände Drahtgeflecht — unter. Der Kasten wurde auf dem Balkon, welcher aber nicht mit Eisengittern, sondern ummauert ist, daher Schutz gegen Wind gewährt, gestellt. Anfang Februar wurde der Kasten hereingenommen, zuerst in ein kälteres, darauf wärmeres Zimmer gestellt und alle Wochen einmal wärmeres Wasser durch den Kasten gegossen. Hin und wieder erschien eine Raupe am Kastenrande, um bald wieder zu verschwinden, später wurden in den Ecken am Boden Gespinnste bemerkt. Die Falter erschienen Anfang April und zwar 14 Stück schöne grosse Thiere.

**Jander.**



## Thais polyxena Schiff.

wurde von mir als Raupe bei Krapina in Kroatien, wo ich mich vor einigen Jahren mehrere Wochen zur Kur aufhielt, häufig gefunden, und zwar an *Aristolochia clematitis* (Osterluzei). Versuche mit anderem Futter waren erfolglos, die Thiere wären eher verhungert, als dass sie anderes Futter angenommen hätten. Bei meiner Abreise konnte ich einige 60 Puppen mitnehmen. Ein grosser Theil Raupen musste wieder an den Fundort, einen von der Reblaus zerstörten Weinberg, gesetzt werden, da ich dieselben, mangels Futter auf der Reise bezw. hier in Breslau, nicht mitnehmen konnte.

Ende März und bis Mitte April nächsten Jahres schlüpften die Falter aus und zwar zu meiner Ueberraschung und Freude nur Stücke, welche ganz erheblich von der Stammform abwichen, ca. 20 Stück der ab. *ochracea* Stdg., davon 1 Stück von orange Färbung, der griechischen Form ähnlich (befindet sich in der Stertz'schen Sammlung), nächstdem die ab. *cassandra* Hüb. in schönen Stücken, sehr dunkel gehalten, die schwarzen Flecke bei einigen zu Wellenlinien verschmolzen; auch waren sämtliche Falter sehr gross. Die typ. Form *Polyxena* war garnicht vertreten. Ein grosser Theil dieser Falter ist in den Besitz der Herren Wiskott und Stertz übergegangen, in meiner Sammlung befinden sich je 4 Stück davon, welche mir viel Freude machen.

Um nun festzustellen, ob von dieser Stelle die Raupen nur aberr.-Falter ergeben, verschaffte ich mir durch Vermittelung eines dortigen Bekannten wieder im Sommer darauf eine Anzahl Puppen und zwar ca. 150 Stück. Ich überwinterte dieselben genau so wie die früheren (auf einem Balcon) und erwartete nun gespannt das Resultat dieser Zucht. Genau wie

früher schlüpften die Falter, normale schöne Thiere, aber nur die Stammform, aberr.-Stücke nur in geringer Zahl, von 150 Puppen 20 Stück und auch nicht so gelb bei ab. Ochracea und so schwarz (cassandra), wie das Jahr vorher, auch waren mehr unausgebildete Falter als bei der vorherigen Zucht, wo keine Puppe den Falter versagte.

Was mag nun wohl zu den Abweichungen der ersten Zucht Veranlassung gegeben haben? Als ich die Raupe fand, war ein sehr nasses Jahr, dort jeden Tag von 10 Uhr Vormittag bis 4 Uhr Nachmittag Gewitter, die übrige Zeit schön warm. Die Pflanzen waren sehr üppig gewachsen, während das Jahr darauf nach mir zugegangener Mittheilung es dort sehr trocken gewesen sein soll, die Pflanzen demnach nicht so saftreich, was wohl recht gut auf die Färbung Einfluss haben könnte.

Leider habe ich weitere Beobachtungen nicht anstellen können, da die Fundstelle wieder mit Weinpflanzen bestellt und demnach Osterluzei nicht mehr geduldet wurde. Auch in der näheren Umgegend ist die Pflanze von meinem dortigen Bekannten nicht mehr aufgefunden worden.

**Jander.**



## Lucanus cervus L.

kommt in der Umgegend von Trentschin in Ungarn häufig vor. Die Larve habe ich wiederholt lebend in angebrochenen wilden Birnbäumen gefunden. Der Waldbestand besteht zu meist aus Buche und Nadelholz, Eiche ist nicht vorhanden, oder doch nur ganz vereinzelt als Strauchwerk. Häufig findet man an freien Berglehnen wilde Obstbäume, welche von den Viehhirten durch Anlegen von Wärmfeuern angebrannt und demzufolge abgestorben sind. Die so zerstörten Bäume fallen bei stärkerem Winde leicht um und ist es alsdann nicht schwer, die daran lebenden Insekten zu finden bezw. zu beobachten.

Käferreste waren im Mulm der hohlen Stämme häufig sowohl von der Stammform als auch von *v. capreola* D. und *Dorcus parallelepidus* L.

Die lebenden Käfer selbst habe ich in Anzahl, das eine mal innerhalb  $\frac{1}{2}$  Stunde 28 Stück *L. cervus* beiderlei Geschlechts von einem einzigen wilden Birnbaume abgenommen und zwar nur von den unteren erreichbaren Zweigen, ein grösserer Theil in den oberen Zweigen war nicht zu erlangen. Auch in den Obstgärten des Ortes waren die Thiere häufig, besonders gegen Abend um die Bäume schwärmend.

Die Larven von *Luc. cervus* scheinen demnach nicht ausschliesslich auf Eiche als Futterpflanze angewiesen zu sein.

Jander.





## Ueber die Eierablage von *Endromis versicolora*.

---

Seit meiner Beschäftigung mit der Entomologie habe ich in jedem Frühjahre mehrere Pärchen oder Weibchen von *versicolora* im Freien gefunden. Als Lohn für das immerhin mühsame Suchen erzielte ich jedoch von jedem Weibchen kaum 30 Eier und zu meinem Aerger musste ich es mit ansehen, wie diese noch im Besitz fast aller Eier stets abstarben. Diesbezügliche Anfragen bei hervorragenden Züchtern zeigten mir nur, dass es anderen Sammlern ebenso erginge, wie mir.

Im Frühjahre 1893 fand ich an einem Tage wiederum 3 *versicolora*-Pärchen, und rathlos stand ich wiederum vor der Frage: Wie bringe ich die Weibchen zur Eierablage? Meine Frau, die mich in entomologischer Thätigkeit schon sehr oft beschämt hat, brachte mich auch diesmal wieder auf eine Idee, deren Durchführung von dem besten Erfolge gekrönt wurde. Wir vergegenwärtigten uns die Art und Weise, wie *Crat. dumi* seine Eier ablegt, einen Vorgang, den wir im Herbst 1892 zu beobachten genügend Gelegenheit fanden. Wenn nämlich die Weibchen von *dumi* eine kleine Anzahl Eier abgelegt haben, bleiben sie einige Minuten regungslos sitzen, erheben sich aber dann und fliegen nicht allzuhoch einige Meter weit, um sich dann wieder zur Eierablage niederzulassen. Da manche Thiere also anscheinend Bewegung nothwendig haben, um ihre Eier ablegen zu können, so versuchte ich dies Mittel auch bei meinen *versicolora*-Weibchen. Nachdem die copula beendet, setzte ich die 3 *versicolora*-Weibchen frei auf einen Tisch. Einige Zeit verblieben sie in vollständiger Regungslosigkeit; dann aber fingen sie an herumzuflattern und sich an einem vorgehaltenen

Birkenzweige zur Eierablage niederzulassen. Kaum 20 Eier hatten aber die einzelnen Weibchen abgelegt, als bei ihnen die leider mir allzubekannte Ruhe wieder eintrat. Da diese jedoch länger anhielt als mir erwünscht war, warf ich die Weibchen einige Male in die Höhe, um sie zum Fliegen zu veranlassen; doch hatte dies wenig Erfolg. Ich fasste hierauf ein Weibchen mit 2 Fingern bei einem Oberflügel und schüttelte es hin und her. Nachdem ich dies einige Male wiederholt hatte, fing es an zu flattern und flog lustig in der Stube herum. Als es sich niedergesetzt hatte, brachte ich einen Birkenzweig in seine Höhe, an welchem es willig eine Anzahl Eier absetzte, um nachher wieder in Unthätigkeit zu verfallen. Doch riss ich es aus derselben immer wieder auf dieselbe Weise gewaltsam heraus, und so gelang es mir, in ca. 4 Stunden die Weibchen zur vollständigen Eierablage zu bringen und über 800 Eier von denselben zu erzielen.

**Grützner.**





# Inhalt.

---

Vereinsnachrichten . . . . .	pag. I.
------------------------------	---------

---

<b>Gerhardt, J.</b>	Ueber <i>Xantholinus linearis</i> Kr. und <i>longiventris</i> Heer . . . . .	„ 1.
„	Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen . . . . .	„ 6.
„	Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1900 . . . . .	„ 15.
„	Eine neue Käferart . . . . .	„ 18.
<b>Schnabel:</b>	Ueber die Zucht von <i>Arctia flava</i> . . . . .	„ 22.
<b>Jander.</b>	<i>Pteretes matronula</i> L. . . . .	„ 24.
„	<i>Thais polyxena</i> Schiff. . . . .	„ 26.
„	<i>Lucanus cervus</i> L. . . . .	„ 28.
<b>Grützner.</b>	Ueber die Eierablage von <i>Endromis versicolora</i> . . . . .	„ 29.

Das Vereinslokal befindet sich im »gelben Löwen«  
Oderstrasse 3.







